# ОПАСНО! ГРИПП

Грипп - это инфекционное заболевание дыхательных путей, передающееся воздушно-капельным путем. Источник инфекции - больной человек, который опасен для окружающих до 7 дней от начала заболевания.



# СИМПТОМЫ



РЕЗКИЙ ПОДЪЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА, ОЗНОБ



ГОЛОВНАЯ БОЛЬ



ЛОМОТА В МЫШЦАХ И СУСТАВАХ



БОЛЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ ГЛАЗ, ВКЛЮЧАЯ ОСТРУЮ РЕАКЦИЮ НА СВЕТ



СУХОЙ КАШЕЛЬ И ЗАТРУДНЕННОЕ, УЧАЩЕННОЕ ДЫХАНИЕ



СЛАБОСТЬ



ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ РАССТРОЙСТВА (ТОШНОТА, РВОТА, ПОНОС)



БОЛЬ/ПЕРШЕНИЕ В ГОРЛЕ

## **ПРОФИЛАКТИКА**



### **CBOEBPEMEHHO** СТАВИТЬ ПРИВИВКУ\*

Рекомендовано прививаться всем начиная с 6 месяцев. Обязательно подлежат вакцинации:

- медицинские работники;
  работники образовательных организаций;
  работники транспорта, коммунальной сферы

- 5. лица старше 60 лет; 6. лица страдающие заболеваниями легких,



РЕГУЛЯРНО МЫТЬ РУКИ С МЫЛОМ ИЛИ ОБРАБАТЫВАТЬ **ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ** СРЕДСТВАМИ



ВЕСТИ **ЗДОРОВЫЙ** ОБРАЗ ЖИЗНИ



**ИСПОЛЬЗОВАТЬ** ОДНОРАЗОВЫЕ САЛФЕТКИ ПРИ <u>ЧИХАНИИ И КА</u>ШЛЕ



ИЗБЕГАТЬ **БОЛЬШОГО** СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ



ИЗБЕГАТЬ **KOHTAKTOB** С БОЛЬНЫМИ

### ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ, НЕОБХОДИМО:



вызвать врача, НЕ ЗАНИМАТЬСЯ САМОЛЕЧЕНИЕМ



пить много **ТЕПЛОЙ** жидкости



ОСТАВАТЬСЯ ДОМА и соблюдать ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ



проводить влажную **VEOPKY** 



**ИСПОЛЬЗОВАТЬ** СРЕДСТВА индивидуальной **ЗАЩИТЫ** 



**ПРОВЕТРИВАТЬ** ПОМЕЩЕНИЕ



Интервал между прививками против гриппа и прививками против иных инфекций, в том числе COVID-19 должен составлять не менее 30 дней.

<sup>\*</sup>Вакцинация от гриппа проводится начиная с 6 - месячного возраста в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (Приказ